

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



Nord Pas de Calais

GRANDES CULTURES

BULLETIN TECHNIQUE N° 4 DU 8 AVRIL 1994

BLE D'HIVER	:	épi 1 cm enfin atteint (premiers blés)
ORGE D'HIVER	:	Helminthosporiose - Rouille naine.
POIS	:	Battance - Attention aux thrips
COLZA	:	Début fleur

BLE D'HIVER

► **STADES** : Les évolutions sont lentes. Peu à peu les premières parcelles dépassent le stade épi 1 cm, mais le gros contingent des blés est plutôt à épi 0,6 - 0,7 cm.

Le Montreuillois, le Sud Cambrésis et la Flandre Maritime sont les plus en avance avec SOISSONS, EUREKA, GENIAL, VIKING, RECITAL.

► **REGULATEURS** : Les interventions sont perturbées par les conditions météorologiques pour les parcelles précoces.

Si le stade épi 1,5 à 2 cm est atteint, ne plus utiliser les CYCOCEL C5 ni C3, mais orienter le choix vers CYCOCEL CL ou MODDUS.

MODDUS s'utilise à 0,4 ou 0,5 l/ha entre les stades épi 4-5 cm et épi 10-15 cm.

► **MALADIES** :

- L'Oïdium est très rare, mais les premières pustules sont signalées dans la région de Lillers sur RECITAL.
- La Rouille Jaune n'est pas encore observée.
- La Septoriose profite des conditions humides du moment pour recontaminer fortement. On peut s'attendre à de nombreux symptômes pour fin avril.
- Le Piétin-Verse est bien présent dans les premiers semis, et le climat actuel est favorable aux recontaminations.

► **DESHERBAGE** : Début d'utilisation des spécialités hormonales du type STARANE pour le rattrapage des gaillets. GRATIL peut aussi être utilisé à ce stade, mais plutôt à 30 - 35 g/ha sur gros gaillets qu'à 20 g/ha.

► **MOUCHE GRISE** : fréquents symptômes depuis au moins 15 jours dans les parcelles à risques. La gravité est limitée étant donné l'absence de gel hivernal.

ORGE D'HIVER

► **STADE** : Petite avance sur les blés ; BALI, PLAISANT, BARBEROUSSE dépassent souvent épi 2 cm.

► **REGULATEUR** : Utilisation de TERPAL 2 à 2,5 l/ha à partir du stade 1er noeud (épi 5 à 10 cm), MODDUS à appliquer aussi à partir de ce stade à la dose de 0,6 à 0,8 l/ha.

► **MALADIES** : L'helminthosporiose est bien implantée. Pression moyenne de Rouille naine ça et là.

► **MOSAÏQUE** : Pratiquement aucune expression de la maladie cette année.

D.R.A.F. - Service Régional de la Protection des Végétaux
BP 47 - 62750 LOOS EN GOHELLE - ☎ 21.28.27.27 - Fax : 21.43.97.72
Abonnement : Régisseur des Recettes D.R.A.F. - BP 505 - 59022 LILLE CEDEX

POIS

► **STADE** : Levée en cours

Très grosses difficultés de levée dans certaines parcelles roulées, sur sols plus ou moins battants. Les pluies violentes de la semaine ont fortement rappuyé la structure.

Dans ces conditions il vaudra mieux intervenir en post levée pour le désherbage après bon redémarrage de la végétation.

► **THRIPS** : Quelques parcelles sur le Boulonnais et le Montreuillois sont infestées. Mais à surveiller partout ailleurs. Risque très élevé dans les parcelles "matraquées" où le développement de la végétation est ralenti, ce qui augmente d'autant plus la sensibilité au thrips.

COLZA

► **STADE** : Toutes premières fleurs

► **MELIGETHES** : Pas d'intervention justifiée.

► **SCLEROTINIA** : Enclencher la protection à mi floraison dès la chute des premiers pétales.



Meligèthe